



Ohren-Korrektur

1/2

Eine Ohrenkorrektur wird bei Anormalität der Ohrenstellung oder –größe durchgeführt. Große oder abstehende Ohren können verkleinert, dem Kopf angelegt und in ihrer Form verändert werden.

Ohrenkorrekturen können in jedem Alter durchgeführt werden. Bei gravierenden Entstellungen ist jedoch eine Korrektur im frühen Kindesalter ratsam. Bei der Operation wird ein Schnitt auf die Rückseite der Ohrmuschel gelegt, so dass auffällige Narben vermieden werden.

Anhand einer genauen Analyse der Ohrenform und Stellung wird die Veränderung im Detail besprochen und der operative Eingriff geplant.

Vorbereitung

Entscheidend für den Behandlungserfolg und die Operation ist die Phase der Erholung und Nachbehandlung – dafür sollte genügend Zeit eingeplant werden. Im Vorgespräch wird Herr Dr. Dr. Muggenthaler klären, ob bei Ihnen Gesundheitsrisiken bestehen und ob bestimmte Voruntersuchungen notwendig sind. Wir teilen Ihnen dann auch mit, welche (blutverdünnenden) Medikamente Sie nicht einnehmen sollten.

Vermeiden Sie am Tag und auf jeden Fall am Abend vor der Operation einen Alkohol- und Nikotinkonsum.

Fakten

Operation

- 1 bis 2 Stunden

Narkoseart

- Örtliche Betäubung evtl. mit zusätzlichem Dämmer Schlaf

Klinikaufenthalt

- Eine Übernachtung oder ambulant

Nachbehandlung

- Verbandswechsel nach einem Tag. Ständiges Tragen eines Verbandes oder Stirnbandes eine Woche lang. Danach 5 Wochen Verband nur während der Nacht

Gesellschaftsfähig

- Nach einer Woche

Seltene Komplikationen

- Asymmetrien. Ungenügendes Anliegen der Ohren, so dass eine zweite Operation durchgeführt werden muss



Operativer Eingriff

Der Eingriff dauert etwa ein bis zwei Stunden und wird gewöhnlich in örtlicher Betäubung und falls nötig in einem leichtem Dämmer Schlaf (Sedierung) unter Aufsicht eines Anästhesisten durchgeführt.

Die Behandlung erfolgt über einen Schnitt auf der Rückseite der Ohrmuschel, der später kaum sichtbar sein wird. Die Ohrmuschel und die Ohrknorpel werden wie im Vorfeld besprochen in Form und Stellung verändert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.

Gesichtschirurgie Mittlere Brücke

Schiff lände 2, CH-4051 Basel, Tel. +41 (0)61 645 50 50

Öffnungszeiten des Sekretariats:

Montag bis Donnerstag: 9–12 Uhr, 14–18 Uhr, Freitag: 9–12 Uhr



Ohren-Korrektur

2/2

Sind die Knorpel und das Ohr in der gewünschten Position, wird es mit permanenten oder sich auflösenden Fäden fixiert.

Der Hautschnitt wird mit einem selbstauflösenden Faden verschlossen. Abschließend wird zum Schutz ein elastischer Verband angelegt.

Nachbehandlung

In unserem Aufwachraum können Sie sich nach dem Eingriff entspannen, bis Sie ganz wach und der Kreislauf stabil ist. Stärkere Schmerzen sind nicht zu erwarten, wohl aber eine gewisse Schwellung und Verfärbung. Den ersten Verbandswechsel wird Herr Dr. Dr. Muggenthaler am Tag nach dem Eingriff durchführen.

In der ersten Woche nach dem Eingriff muss in den meisten Fällen ein Verband oder ein Stirnband getragen werden. Für weitere fünf Wochen empfehlen wir nachts einen Schutzverband, damit die Ohren vor einem Abknicken geschützt sind. Während dieser Zeit sollten Sie die Ohren vor äußeren Einwirkungen schützen und sportliche Betätigungen einschränken.

Die endgültige Form der Ohren wird erst nach der endgültigen Abschwellung nach ein paar Wochen erkennbar sein.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.

Gesichtschirurgie Mittlere Brücke

Schiffplände 2, CH-4051 Basel, Tel. +41 (0)61 645 50 50

Öffnungszeiten des Sekretariats:

Montag bis Donnerstag: 9–12 Uhr, 14–18 Uhr, Freitag: 9–12 Uhr